

APH Atendimento que procura chegar à vítima nos primeiros minutos após ter ocorrido o agravo à sua saúde, agravo esse que possa levar à deficiência física ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento adequado e transporte a um hospital devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) - Resolução CFM nº 1.671, de 09 jul. 2003.

O SISTEMA APH

- ✓ RECEBE OS CHAMADOS DE EMERGÊNCIA
- ✓ DESPACHA O RECURSO MAIS ADEQUADO
- ✓ ORIENTA O SOCORRISTA NA RUA
- ✓ E FACILITA A ENTRADA NO SISTEMA HOSPITALAR

NO APH TEMOS DE TER E FAZER:

- ✓ RÁPIDO ACESSO
- ✓ MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS
- ✓ CONTROLE DO SANGRAMENTO
- ✓ CONTROLE E PREVENÇÃO DO CHOQUE
- ✓ IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE

TRIPÉ DO APH

- Manutenção da Via Aérea
- Controle da Hemorragia Externa e Choque
- Imobilização do Paciente

PARA ATENDER DEVEMOS FAZER:

- ✓ Dimensionamento (avaliação) da cena;
- ✓ Avaliação inicial do paciente - **AVALIAÇÃO PRIMÁRIA**;
- ✓ Avaliação dirigida (para trauma ou para problemas médicos);
- ✓ Avaliação física detalhada - **AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA**; e
- ✓ Avaliação continuada.

PROTOCOLO:

Procedimento padronizado utilizado mundialmente que objetiva garantir um atendimento sincronizado dos socorristas envolvidos diminuindo o tempo gasto com a vítima no local e durante o transporte ao recurso hospitalar. (Ref.: PHTLS e ATLS).

POSICIONAMENTO:

Sistema de funções específicas dos socorristas minimizando erros e demora no atendimento garantindo que todas as ações necessárias sejam executadas em uma ordem de prioridades e necessidades

EXAME PRIMÁRIO - AVALIAÇÃO INICIAL (AVALIAÇÃO PRIMÁRIA)

- ✓ A - Vias Aéreas com controle da Coluna Cervical
- ✓ B - Respiração com administração de Oxigênio
- ✓ C - Circulação com controle de Hemorragias
- ✓ D - Nível Neurológico (escala de coma de Glasgow)
- ✓ E - Exposição com controle da Hipotermia

EXAME SECUNDÁRIO - É O HISTÓRICO E O EXAME FÍSICO DETALHADO (AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA)

SINAIS VITAIS = FC / FR / SPO2% / PA / TC / DOR

Acrônimo **AMPLA** (Ref.: Colégio Americano de Cirurgiões - ATLS/PHTLS):

- ✓ A Alergias
- ✓ M Medicamentos de uso habitual
- ✓ P Passado médico, prenhez, doenças e cirurgias
- ✓ L Líquidos e alimentos ingeridos
- ✓ A Ambiente - eventos que levaram ao problema

FAÇA O EXAME DA CABEÇA AOS PÉS - CEFÁLO-PODÁLICO

ENCAMINHE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL A TRATAMENTO HOSPITALAR ADEQUADO.

As principais causas de alteração do nível de consciência em um traumatizado são:

Oxigenação cerebral diminuída;
Hipotensão;
Trauma cranioencefálico;
Intoxicação por álcool ou drogas;
Distúrbio metabólico.

Ref.: APH-GRAU-2ªEd.2015